**PROVTAGNINGSINSTRUKTION**

# Instruktion för listeriaprovtagning på ytor i livsmedelslokaler

## VAR

Provpunkter kan vara ytor som kommer i direkt kontakt med oförpackade livsmedel, t ex. skärmaskiner, skärbrädor, blandare, saltinjektionsmaskiner, transportband och förpackningsutrustning. Eller miljöprover, som t ex. golv, golvbrunnar, ventilationsdon, rengöringsutrustning, vagnshjul, kylflänsar mm.

## NÄR

Provtagning bör utföras under produktion efter minst två timmar eller i slutet av produktionskörningen, dvs före rengöring och desinfektion.

## HUR

Med kompress
Lämplig för att ta prov på större ytor.

*Fuktig yta*
Tag på en steril handske på ena handen och tag kompressen i samma hand. Eller använd plastpåsen ut- och in. Torka sedan av ytan, om möjligt 1000 cm² - 3000 cm².
Torka kraftigt med en sicksackrörelse över hela den valda ytan i två vinkelräta riktningar, och byt samtidigt yta på kompressen. Stoppa kompressen i en plastpåse som knyts åt så att minsta möjliga luftvolym blir kvar i påsen. Byt handske innan nästa prov tas för att undvika förorening mellan proven. När alla är uttagna stoppas dessa, för att hindra läckage, i en tillknuten ytterpåse av plast.

*Torr yta*
Följ anvisningen för fuktig yta men fukta först kompressen med en Dilucup eller pepton saltlösning.

Med tops
Lämplig för att ta prov på svåråtkomliga små områden.

*Fuktig yta*
Ta ut topsen ur röret. Gnugga kraftigt med en sicksackrörelse över hela den valda ytan i olika riktningar och rotera samtidigt svabben.
Stoppa sedan ner topsen i röret igen. Stoppa i en plastpåse och knyt till.



SGS Analytics Sweden AB | Olaus Magnus Väg 27 P.O. Box 1083, 581 10 Linköping **t** +46 (0)13 25 49 00 **e** se.ie.info@sgs.com sgs.com/analytics-se

*Torr yta*
Ta ut topsen ur förpackningen. Fukta topsen med en Dilucup eller peptonlösning. Pressa topsen mot dilucupens vägg för att få bort överflödig vätska så att den är fuktig men inte våt. Svabba önskad yta.

**PROVTAGNINGSMATERIAL**

Sterila gaskompresser, plastpåsar, tops, engångshandskar, Dilucup (pepton saltlösning, 9 ml). **OBS! Dilicup ska förvaras i 4 - 8 grader fram till användning**.

**OBS!**
Glöm inte att märka påsarna och var aktsam vid provtagningen så att inte kontaminering mellan provpunkterna sker.

**PROVSKICKNING:**

Lägg proverna i en plastpåse, t ex Jiffypåse, och placera dem överst i väskan om de skickas i en kylväska tillsammans med andra prover.

**Packa prover i en kylväska om transporttiden är längre än 24 timmar.**